

## Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)

### Taxonomi

<b>Artsnavn (latinsk navn):</b>	Carnegiella strigata
<b>Populærnavn (dansk navn):</b>	Marmor øksefisk, marmoreret øksefisk
<b>Familie (latin):</b>	Gasteropelecidae
<b>Type:</b>	Ferskvand, Øksefisk
<b>Opdager (beskrevet af):</b>	Günther, 1864
<b>Førstegangsoodræt i DK:</b>	

### Levested

**Verdensdel:** Sydamerika.

**Biotop (beskrivelse af regionen):**

### Udseende

<b>Størrelse:</b>	Han: 4,0-4,5 cm - Hun: 4,0-4,5 cm
<b>Form:</b>	Kroppen set fra siden meget sammenpresset. Økseformet kropsform. Mangler fedtfinne Meget kraftige brystfinner.
<b>Farve:</b>	Kropsfarven ændres efter lysindfald, grundfarven er sølvglinsende med blå, gule og grønne nuancer. Fra gællelåget og til haleroden et gyldent bånd. 3-4 mørke bånd fra bugkanten mod ryggen.
<b>Kønsforskel:</b>	Vanskeligt at se forskel på kønnene, hunner formentlig rundere og kraftigere bygget.

**Varianter:**

### Behov

<b>Dekorationer:</b>	Opholder sig næsten udelukkende i vandoverfladen, der indrettes her delvist med flydeplanter og områder med frit vand.
<b>Adfærd:</b>	Fredelig, bør kun holdes sammen med andre små fredelige fisk.
<b>Social:</b>	Fredelig stimefisk. Der bør ikke holdes mindre end 6 individer og gerne flere. Holder man få individer vil de ofte blive sky.
<b>Foder:</b>	Levende og frostfoder foretrækkes. Kan også tage tørfoder. I naturen lever Carnegiella strigata primært af insekter.

### Vandet

<b>Akvariestørrelse:</b>	80
<b>Niveau:</b>	Øvre zone
<b>Vandcirkulation:</b>	Middel

**Min. pH:** 5,0

**Max. pH:** 7,5

**Min. dH:** 5

**Max. dH:** 20

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:** Medium

### Formering

**Ynglebiologi:** Lægges i vandoverfladen blandt fintløvede planter, fx Cabomba. Vigtigt med god vandkvalitet. Holdes bedst i blødt let surt vand.

**Drægtighed:** Æg klækker efter ca 36 timer ved 25 grader.

**Leg:** Opdrættes kun sjældent i akvarier. Indledningen til legen er en dans med flagrende bevægelser i vandoverfladen. For at fremme leg anbefales det at fodre med insektfoder, fx bananfluer.

**Øvrigt omkring opdræt og yngel:** Efter æggene er lagt fjernes forældrefiskene da de ellers vil æde æggene. Yngel fodres op med småt levende foder fx artemia.

### Øvrige oplysninger

**Generel beskrivelse** Med de kraftige brystfinner kan *Carnegiella strigata* "flyve" et stykke over vandoverfladen. I naturen er det et forsvar mod angribende fisk. Der er vigtigt med et tætsluttende dækglas. Musklerne ved brystfinnerne er meget kraftige og kan udgøre op til 25% af fiskens samlede vægt.

Skal muligvis opdeles i 2 forskellige arter, *Carnegiella strigata fasciata* fra Guyana og *Carnegiella strigata strigata* som kommer fra Peru. Sidstnævnte har mindre markede sorte streger på kroppen.

Første gang importeret til Europa i 1910

Det latinske navn har følgende betydning  
*Carnegiella* : Efter Miss Carnegie  
*Strigata* : Stribet

**Forfatter:** Jacob Niss



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)